

**Методические рекомендации  
по оснащению пунктов медицинской помощи обучающимся  
в пунктах приема экзаменов**

Для обеспечения охраны здоровья детей в период проведения экзаменов в пунктах приема экзаменов (далее – ППЭ) необходимо предусмотреть своевременное оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования представляют графики проведения Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), адрес ППЭ в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

При организации ППЭ в образовательной организации медицинская помощь обучающимся оказывается в медицинском кабинете в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н, которым предусмотрен стандарт оснащения медицинского блока образовательной организации.

В случае отсутствия в образовательной организации медицинского кабинета органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают присутствие медицинского работника в ППЭ согласно представленной органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования информации (графики проведения ЕГЭ, адрес ППЭ), а также обеспечивают укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в ППЭ согласно Приложению. По экстренным показаниям для устранения угрозы жизни несовершеннолетнему обеспечивают возможность приезда бригады скорой медицинской помощи в ППЭ. в течение не более, чем 20 мин.

Во время проведения ЕГЭ при длительности его проведения до 4-х часов питание не предусмотрено.

Вместе с тем необходимо предусмотреть обеспечение соблюдения питьевого режима экзаменирующихся в период проведения ЕГЭ. В связи с этим в ППЭ в помещении, где проводится ЕГЭ, размещается стол с бутилированной водой без газа объемом 0,33-0,5 л (по потребности) или кулер для воды с одноразовыми пластиковыми стаканчиками.

В случае сдачи экзаменов детьми, страдающими сахарным диабетом 1 типа, необходимо обеспечивать возможность многократного контролирования уровня глюкозы в крови и принимать меры к его коррекции – прием легкоусвояемых углеводов при гипогликемии либо дополнительное введение инсулина.

У ребенка должны быть: глюкометр, шприц-ручка или инсулиновая помпа.

Если в результате сдачи ЕГЭ у ребенка развилась декомпенсация сахарного диабета рекомендуется ставить вопрос о переносе экзамена или его проведения в щадящем режиме.

Приложение

**Рекомендуемая укладка  
для оказания неотложной медицинской помощи в ППЭ**

1. Тонометр с возрастными манжетами – 1
2. Стетофонендоскоп – 1
3. Лоток медицинский почкообразный – 1
4. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» – 1 комплект
5. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) – 1
6. Пинцет – 1
7. Шпатели – 10
8. Ножницы – 1

9. Шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл по 5 шт. каждого наименования
10. Жгут кровоостанавливающий – 1; губка гемостатическая
11. Перчатки медицинские
12. перевязочный материал: 70% этиловый спирт – 50 мл (спиртовые салфетки в упаковке); 5% спиртовой раствор йода – 5 мл, 10% р-р аммиака – 1 фл.; 3% р-р перекиси водорода – 1 фл.; бинт стерильный, салфетки стерильные, лейкопластырь
13. Примерный перечень медицинских препаратов для оказания неотложной медицинской помощи: Адреналина гидрохлорида 0,1%-й р-р в ампулах по 1 мл; Анальгин 50% р-р в ампулах по 1 мл; Димедрол 1% р-р в ампулах по 1 мл; Тавегил р-р в ампулах по 2 мл; Эуфиллин 2,4% р-р в ампулах по 10 мл; Натрия хлорид 0,9% р-р – 1 флакон; Кофеин-бензоат натрия 10% р-р в ампулах по 1 мл; Глюкоза 40% р-р в ампулах по 20 мл, Преднизолон по 1 мл (30 мг) р-р для инъекций; Лазикс 1% р-р в ампулах по 2 мл для инъекций; Но-шпа 2 мл (40 мг) в ампулах для инъекций; Сальбутамол аэрозоль (100 мкг/доза) 1 фл.; Валериана настойка – 1 фл.; Корвалол – 1 фл.; Парацетамол 0,5 в т аблетках – 1 уп.; Капотен 25 мг – 1 уп.; Цетиризин 10 мг – 1 уп.; Активированный уголь 0,5 – 1 уп.